

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
LONSURF® (trifluridina y tipiracilo)
Comprimidos

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de LONSURF?

Su proveedor de atención médica debe realizar análisis de sangre antes de que usted reciba LONSURF, a los 15 días durante el tratamiento con LONSURF y según sea necesario para controlar sus hemogramas.

LONSURF puede ocasionar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

Niveles bajos en los hemogramas. Los niveles bajos en los hemogramas son frecuentes con LONSURF y, en ocasiones, pueden ser graves y potencialmente mortales. LONSURF puede causar una disminución de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Niveles bajos de glóbulos blancos pueden hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían provocar la muerte. Su proveedor de atención médica podría:

- reducir su dosis de LONSURF o interrumpir la administración de LONSURF si presenta recuentos bajos de glóbulos blancos o plaquetas.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta cualquiera de los siguientes signos y síntomas de infección durante el tratamiento con LONSURF:

- fiebre
- escalofríos
- dolor corporal

Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LONSURF?” para obtener más información sobre los efectos secundarios.

¿Qué es LONSURF?

LONSURF es un medicamento recetado que se usa para tratar a personas con cáncer de colon o recto que se ha extendido a otras partes del cuerpo y quienes han recibido tratamiento previo o no pueden recibir determinados tipos de medicamentos quimioterapéuticos.

Se desconoce si LONSURF es seguro y efectivo en niños.

Antes de tomar LONSURF, hable con su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- tiene problemas hepáticos o renales
- está embarazada o planea quedar embarazada. LONSURF puede dañar al feto.

Para mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Debe usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con LONSURF.
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada.

Para hombres:

- Debe usar un condón al tener relaciones sexuales con parejas de sexo femenino que puedan quedar embarazadas durante su tratamiento con LONSURF y por 3 meses después de su última dosis de LONSURF. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si su pareja queda embarazada mientras usted toma LONSURF.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si LONSURF pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LONSURF y por un día después de su última dosis de LONSURF.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cómo debo tomar LONSURF?

- Tome LONSURF exactamente como lo indique su proveedor de atención médica. LONSURF se presenta en dos concentraciones. El proveedor de atención médica podría indicarle ambas concentraciones para su dosis recetada.
- Tome LONSURF en el plazo de 1 hora después de desayunar o cenar.
- Su cuidador debe usar guantes al manipular los comprimidos de LONSURF.
- Si omite una dosis de LONSURF, no tome dosis adicionales para compensar la dosis que no tomó. Llame a su proveedor de atención médica para recibir instrucciones sobre lo que debe hacer si omite una dosis.
- Lávese las manos después de manipular los comprimidos de LONSURF.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LONSURF?

LONSURF puede ocasionar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

• Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de LONSURF?”

Los efectos secundarios más frecuentes de LONSURF incluyen:

- cansancio
- náuseas
- disminución del apetito
- diarrea
- vómitos
- dolor abdominal
- fiebre

Informe a su proveedor de atención médica si tiene náuseas, vómitos o diarrea grave o que no desaparece. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LONSURF. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica. Comuníquese con su médico para obtener consejos médicos sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar LONSURF?

- Guarde LONSURF a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).
- Si guarda LONSURF fuera del frasco original, deseche (tire) todos los comprimidos sin usar de LONSURF después de 30 días.
- Hable con su proveedor de atención médica para saber cómo desechar LONSURF de manera segura.

Mantenga LONSURF y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de LONSURF

En ocasiones, se recetan medicamentos para fines distintos de los mencionados en un folleto informativo para el paciente. No use LONSURF para ninguna afección para la cual no ha sido recetado. No entregue LONSURF a otras personas, aunque estas tengan los mismos síntomas que usted. Les puede hacer daño. Si desea obtener más información, hable con su proveedor de atención médica. Puede preguntar a su farmacéutico o proveedor de atención médica sobre información de LONSURF escrita para profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de LONSURF?

Ingredientes activos: trifluridina y clorhidrato de tipiracilo

Otros ingredientes: monohidrato de lactosa, almidón pregelatinizado, ácido esteárico, hipromelosa, polietilenglicol, dióxido de titanio, óxido férrico (únicamente el comprimido de 20 mg) y estearato de magnesio

Impresiones con tinta: goma laca, óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo, dióxido de titanio, laca de aluminio según la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) azul n.º 2, cera de carnauba y talco.

Fabricado por: Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., Japón

Fabricado para: Taiho Oncology, Inc., Princeton, NJ 08540 EE. UU.

LONSURF es una marca comercial registrada de Taiho Oncology, Inc. Para obtener más información, visite www.Lonsurf.com o llame al 1-844-878-2446.